

TITULO: INOVAÇÃO NO DESBRIDAMENTO DE FERIDAS

Autor: Célia Carvalho, Dilma Pereira, Graça Farelo, Paula Botelho

Introdução

A presença de tecido necrosado ou desvitalizado no leito da ferida pode retardar o processo de cicatrização visto que atua como uma barreira física à formação de tecido de granulação e constitui um ambiente propício à proliferação de micro-organismos. O tecido necrosado dificulta, ainda, a correta avaliação da categoria da úlcera de pressão.

Objetivos

Avaliar a eficácia de utilização de um apósito de poliacrilato com solução de ringer e polihexanida (Tender Wet Plus®)

Metodologia

Estudo de Caso

Desenvolvimento

Mulher de 84 anos de idade, dependente em grau elevado nos autocuidados, internada num serviço de Medicina por Quadro Sético por Infecção do Trato Urinário e Úlcera de Pressão(UP) infetada. O internamento decorreu no período de 10 a 27 de Janeiro de 2012. Acamada há 7 anos por patologia osteoarticular, obesa, com edemas periféricos. UP identificada no domicílio com 2 meses de evolução.

Características da UP: 25/01/2012 –UP Categoria IV, na região Sacro. Dimensões: 10cmx8cmx2cm; 50% tecido desvitalizado, 50% tecido de granulação. Exsudado hematopurulento, abundante, com cheiro fétido, região perilesional macerada. Com dor exacerbada pela realização do tratamento local.

Nesta data iniciou tratamento local com TenderWet Plus com periodicidade de 3/3dias.

Resultados: Eliminação do tecido desvitalizado, controlo do odor, crescimento do tecido de granulação e diminuição nas dimensões da lesão. Como intercorrência verificou-se a presença de maceração na região perilesional, controlada com protetor cutâneo.

Conclusão

A utilização do TenderWet Plus foi eficaz no desbridamento e controlo do odor numa Úlcera de Pressão categoria IV, e efectivo na eliminação de uma barreira para a preparação adequada do leito da ferida.

Referências Bibliográficas

Ficha Técnica do produto, Hartmann

Guidelines de Prevenção e Tratamento de UP, EPUAP/NPUAP, 2009

Documento de Consenso da EWMA – Preparação do Leito da Ferida