

COMUNICAÇÃO Nº 6

TÍTULO: GANHOS EM SAÚDE COM TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA CONTROLADA.

Autor: Maria Clara Paulo Lourenço; Sandra da Conceição Reis Pádua Cruz; Pedro Parreira

Introdução

Os desenvolvimentos científicos e tecnológicos têm proporcionado abordagens terapêuticas inovadoras em várias áreas do conhecimento, nomeadamente na prevenção e tratamento de feridas de difícil cicatrização. Daí que as competências empreendedoras de experimentação e implementação por parte dos profissionais de saúde de novas abordagens terapêuticas, concorra decisivamente para a eficácia e eficiência dos cuidados de saúde.

É esta postura proactiva das equipas, a qual assenta em conhecimentos profundos sobre as diversas formas de atuação e adequação à situação particular, que nos permite ajuizar sobre a melhor abordagem em termos de custo/efetividade (Cunha; 2006).

Objetivos

Foi efetuado um estudo que teve como objetivo avaliar o impacto da abordagem terapêutica (Terapia de Pressão Negativa Controlada) perante feridas de difícil cicatrização, e o seu impacto na redução do tempo de tratamento, satisfação do utente e custo para a organização.

Metodologia

Este estudo centra-se numa metodologia de investigação-ação iniciada em 2012 no serviço de CCP/U do IPOCFG, EPE com uma amostra de 10 casos até ao momento.

Desenvolvimento

A Terapia de Pressão Negativa Controlada é um processo não invasivo que promove a drenagem do excesso de fluídos do leito da ferida e do espaço intersticial reduzindo a população bacteriana e o edema, aumentando o fluxo sanguíneo local e a formação do tecido de granulação contribuindo para a melhor cicatrização das feridas (Blume et al., 2008).

Conclusões

Estes resultados mostram que a Terapia de Pressão Negativa Controlada apresenta-se como uma opção eficaz para acelerar o crescimento do tecido de granulação. Apesar de

representar um custo elevado, obteve-se uma redução de cerca de 75 000€ no tratamento destes utentes.

Referências Bibliográficas

Cunha, ONA (2006). Sistematização da assistência de enfermagem no tratamento de feridas crônicas.

http://www.abenpe.com.br/diversos/sae_tfc.pdf

Blume, PA et al. (2008). Comparison of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure with advanced moist wound therapy in the treatment of diabetic foot ulcers: a multicenter randomized controlled trial.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18162494>