

COMUNICAÇÃO LIVRE Nº 05

TÍTULO: CARCINOMA BASOCELULAR DA PIRÂMIDE NASAL: ESTUDO DE CASO

Autor: Maria Clara Paulo Lourenço

Introdução

Quando existe um diagnóstico de cancro da pirâmide nasal, é necessária uma intervenção cirúrgica para a remoção deste e para a reconstrução da pirâmide nasal (Fernandes, 2010). Os cancros da pirâmide nasal correspondem a cerca de 3% dos cancros da cabeça e pescoço, e o basalioma é o tipo de cancro mais comum na raça caucasiana e corresponde a cerca de 60-75% dos cancros cutâneos epiteliais (Araújo et al, 2008; Oliveira, 2011), no entanto ainda chega tardiamente ao IPOCFG, EPE.

Objetivos

Pretende – se analisar se a aplicação de sulfadiazina de prata e de carboximetilcelulose levam à descontaminação da ferida e à sua total granulação.

Metodologia

Neste estudo de caso o Sr. J. J. S. com 83 anos de idade do sexo masculino com diversas comorbilidades e foi enviado pela médica de família por lesão ulcerada de fundo irregular e contorno papuloso translúcido eritematoso com cerca de 3 cm no dorso do nariz que persiste há 3 anos.

Desenvolvimento/Resultados

Na primeira observação não apresenta adenopatias regionais palpáveis. Feita biópsia incisional e TAC Maxilofacial 21 -08 – 2015. O estudo Histológico confirma “Basalioma externo do dorso do nariz”. Propõe – se ao doente “excisão de lesão com plastia e enxerto de pele” e este foi ao bloco operatório da CCP do IPOCFG, EPE, no dia 04/09/2015 para ser

submetido a “excisão de lesão patológica do dorso do nariz” e ficou com toda a cartilagem da pirâmide nasal exposta no dia 5/11/2015 foi aplicada gaze parafinada. No 3º dia de pós-operatório a lesão apresentava fibrina e infeção (zaragatoa - pseudomonas aeruginosas) pelo que se optou por aplicar um apósito lípido-coloidal impregnado de sulfadiazina de prata (Lazareth, 2008; Harding, 2012), durante 5 dias.

Quando a ferida se encontrava sem infeção, foi aplicada uma compressa de espuma de poliuretano com uma matriz polimérica de carboximetilcelulose, e com componentes lipídicos e NOSF que fez a ferida profunda granular completamente. Posteriormente no dia 23/11/2015 foi novamente ao Bloco Operatório para “enxerto de pele com ty - over”.

No dia 27/11/2015 a ferida encontrava - se completamente cicatrizada e tem alta clínica. Os resultados obtidos demonstram que os apósitos escolhidos para o caso granularam toda a extensão da pirâmide nasal como se pretendia e sem dor para o doente.

Conclusão

Existe a necessidade da realização de outros estudos para verificar a eficácia deste tratamento não podemos, portanto, generalizar as conclusões obtidas só com este estudo de caso.

Referências Bibliográficas

Araújo et al (2008) - Tumores Naso-sinusais raros: série de casos e revisão de literatura. «http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S003472992008000200025&script=sci_arttext»

Fernandes (2010) - Retalhos Cutâneos da Pirâmide Nasal. «[file:///C:/Users/clara/Downloads/Retalhos%20cut%C3%A2neos%20para%20a%20reconstru%C3%A7%C3%A3o%20do%20nariz%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/clara/Downloads/Retalhos%20cut%C3%A2neos%20para%20a%20reconstru%C3%A7%C3%A3o%20do%20nariz%20(2).pdf)»

Oliveira (2011) - Análise retrospectiva do carcinoma baso celular no Serviço de Dermatologia do Hospital Sousa Martins. file:///C:/Users/clara/Downloads/a21366_4956pdf.pdf

Lazareth, I. - The Role of a Silver Releasing Lipido-colloid Contact Layer in Venous Leg Ulcers Presenting Inflammatory Signs Suggesting Heavy Bacterial Colonization: Results of a Randomized Controlled Study. PubMed Central (PMC) US National Library of Medicine National Institutes of Health. 20(6):158–166, 2008.

Harding, K. - A prospective, multi-centre, randomised, open label, parallel, comparative study to evaluate effects of AQUACEL Ag and Urgotul Silver dressing on healing of chronic venous leg ulcers. PubMed Central (PMC) US National Library of Medicine National Institutes of Health. 9(3):285-94, 2012.