



As aparências iludem...

Margarida Fernandes*, I. Margarida Costa** e M. Deolinda Auxtero**

*Egas Moniz School of Health and Science - Instituto Universitário Egas Moniz. Monte de Caparica.

UC: Farmacocinética e Farmacologia I; Projeto ESPIEM (Estudante, 3º ano MICF)

**Egas Moniz School of Health and Science - Instituto Universitário Egas Moniz. Monte de Caparica (Docente)



Caracterização do doente

- Mulher com doença de Alzheimer
- Portuguesa, 82 anos, IMC 29,1 (Excesso de peso)
- Sem problemas renais conhecidos
- Não é intolerante à lactose
- Vive com o cuidador de 51 anos, que é o responsável pela administração da medicação



Hábitos



- Não consome bebidas alcoólicas
- Bebe regularmente café e chá (camomila)
- Nunca fumou
- Nunca faz proteção solar



Medicação


Medicamento	Fármaco	Dosagem	Forma Farmacêutica	Posologia
Memantina Tecnigen	Cloridrato de memantina ³	20 mg	Comprimidos revestidos por película	1 peq. alm.
Rivastigmina Zentiva	Rivastigmina ³	9,5 mg/24h	Adesivo transdérmico	1 adesivo manhã
Eutirox	Levotiroxina sódica ²	75 µg	Comprimidos	1 em jejum
Sertralina Zentiva	Sertralina ^{1, 3}	50 mg	Comprimidos revestidos por película	1 peq. alm.
Quetiapina Ciclum	Quetiapina ³	25 mg	Comprimidos revestidos por película	1 almoço
Quetiapina Ciclum	Quetiapina ³	100 mg	Comprimidos revestidos por película	1 jantar
Sinvastatina toLife	Sinvastatina ^{1,2}	20 mg	Comprimidos revestidos	1 jantar
Binosto	Ácido alendróico ^{1,2}	70 mg	Comprimidos efervescentes	1/semana

¹Fotossensibilizante; ² Prescrito pelo médico de família; ³ Prescrito por outro médico




Perigos / Discussão

Embalagens semelhantes Dosagens diferentes



Almoço





Jantar




Risco de confusão


Interação grave (Medscape Interaction Checker)



↑ Intervalo QT



Fármacos fotossensibilizantes



Sem proteção solar



Risco de
fotoalergia/fototoxicidade

CONCLUSÕES

- ✓ É necessário avaliar junto do prescritor a pertinência de alterar a terapêutica
- ✓ O risco de confusão com as embalagens idênticas deve ser analisado e arranjar estratégias para o evitar
- ✓ A doente necessita de fazer uma foto-proteção regular.