


REGISTO ONCOLÓGICO PROMOTOR DA QUALIDADE ASSISTENCIAL



15 de março de 2017

CANCRO UROLÓGICO E GENITAL MASCULINO Análise estatística de 2011 a 2015

Sofia Loureiro dos Santos
Sandra Farinha
RO - HVFX

Sumário

I. Neoplasias do rim - evolução entre 2011 e 2015

1. Evolução de novos casos; distribuição etária e por género
2. Tipo histológico; estádios de apresentação
3. Tipo de terapêutica

II. Neoplasias do testículo de 2011 a 2015

1. Distribuição etária; tipo histológico; estádios de apresentação

III. Neoplasias da bexiga - evolução entre 2011 e 2015

1. Evolução de novos casos; distribuição etária e por género
2. Estádios de apresentação
3. Relação neoplasias não invasivas / neoplasias invasivas; tipo histológico
4. Tipo de terapêutica


IV. Neoplasias da próstata – evolução entre 2011 e 2015

1. Evolução de novos casos; distribuição etária
2. Tipo histológico; estádios de apresentação
3. Tipo de terapêutica
4. Análise do percurso dos doentes
 - a) Entre o diagnóstico e a primeira consulta
 - b) Entre a primeira consulta e o tratamento
 - c) Entre o diagnóstico e o tratamento


V. Considerações finais

I. Neoplasias do rim - evolução entre 2011 e 2015

1. Evolução de novos casos; distribuição etária e por género




- Não houve diferença entre o número de casos registados em 2011 e 2015
- Observa-se um grande aumento de casos em 2013 (200%) tendo descido novamente até 2015
- 74% dos casos são do género masculino, entre os 50 e os 70 anos (58%)




I. Neoplasias do rim - evolução entre 2011 e 11 e 2015

2. Tipo histológico; estádios de apresentação




- O tipo histológico mais frequente foi o carcinoma de células renais (células claras) – 71%
- Em 77% dos casos a doença apresentou-se em fase local ou locoregional



I. Neoplasias do rim - evolução entre 2011 e 11 e 2015


3. Tipo de terapêutica

- A nefrectomia foi a terapêutica de escolha em 77% dos casos
- Em 19% dos casos não há registo de terapêutica





II. Neoplasias do testículo de 2011 a 2015

1. Distribuição etária; tipo histológico; estádios de apresentação




- As neoplasias testiculares aparecem predominantemente entre os 30 e os 50 anos
- O seminoma foi o tipo histológico mais frequente (66%)
- Cerca de 1/3 dos casos apresentavam-se com doença metastática




III. Neoplasias da bexiga - evolução entre 2011 e 2015

1. Evolução de novos casos; distribuição etária e por género




- De 2011 para 2015 houve um ligeiro aumento de 6% do registo de novos casos de neoplasias da bexiga
- 83% dos casos pertencem ao género masculino, 64% entre os 60 e os 80 anos



III. Neoplasias da bexiga - evolução entre 2011 e 2015

2. Estádios de apresentação




- Os estádios I e II predominam em ambos o géneros (47%)
- Observa-se uma percentagem elevada de registos com estadiamento desconhecido (24%)
- 94% das neoplasias apresentam-se como doença local ou loco-regional

III. Neoplasias da bexiga - evolução entre 2011 e 2015

3. Relação neoplasias não invasivas / neoplasias invasivas; tipo histológico


- A percentagem de carcinomas não invasivos é de 40%
- 85% dos casos foram classificados como carcinoma de células de transição, SOE



III. Neoplasias da bexiga - evolução entre 2011 e 2015


4. Tipo de terapêutica

- 92% dos casos fizeram terapêutica com atividade antitumoral, não havendo diferenças entre os estádios de apresentação




IV. Neoplasias da próstata - evolução entre 2011 e 2015

1. Evolução de novos casos; distribuição etária





- De 2011 para 2015 houve um **aumento de 122%** do registo de novos casos de neoplasia da próstata
- 80% dos casos aparecem entre as 6ª e 8ª décadas



IV. Neoplasias da próstata - evolução entre 2011 e 2015


2. Tipo histológico; estádios de apresentação

- O tipo histológico “adenocarcinoma SOE” representa 98% das neoplasias
- Em cerca de 90% a doença apresenta-se como local ou loco-regional




IV. Neoplasias da próstata - evolução entre 2011 e 2015

3. Tipo histológico; estádios de apresentação




- Na maioria dos casos (73%) a terapêutica não foi cirúrgica (hormonoterapia, etc.)
- Nos doentes submetidos a cirurgia a prostatectomia radical foi o procedimento mais frequente (89%)



IV. Neoplasias da próstata - evolução entre 2011 e 2015

4. Análise do percurso dos doentes


a) Entre o diagnóstico e a primeira consulta



IV. Neoplasias da próstata - evolução entre 2011 e 2015

4. Análise do percurso dos doentes

b) Entre a primeira consulta e o tratamento




- O percurso entre a 1ª consulta e o 1º tratamento não sofreu alterações significativas (percentagem de casos num mesmo período aumentou de 62% em 2011 para 67% em 2015).

IV. Neoplasias da próstata - evolução entre 2011 e 2015

4. Análise do percurso dos doentes

c) Entre o diagnóstico e o tratamento



- Em relação ao percurso entre o diagnóstico e o tratamento houve uma acentuada melhoria – num mesmo período a percentagem aumentou de 63% em 2011 para 95% em 2015.

V. Considerações finais

- As neoplasias da próstata, ao contrário das renais, vesicais e do testículo, sofreram um acentuado aumento de novos casos – 122%.
- As neoplasias não invasivas representam 9% do total, sendo em maior número entre os 40 e os 50 anos
- Os tipos histológicos observados seguem as frequências descritas para os referidos órgãos.
- A cirurgia foi o procedimento terapêutico de eleição nas neoplasias renais
- A análise da evolução do percurso dos doentes com neoplasia prostática, entre 2011 e 2015, demonstrou uma acentuada melhoria – em 2011 a percentagem de casos diagnosticados e tratados precocemente era de 63% tendo passado para 95% em 2015.