

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA DE UM PROTOCOLO DE USO DE PRODUTOS COM POLIHEXANIDA (PHMB 0,2%) EM PORTADORES DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA

Autor: Vera Lúcia Andreoli / Tânia Alves de Melo

Introdução

A Epidermólise Bolhosa (EB) é definida como um grupo de desordens da pele caracterizado pela formação de bolhas após trauma mínimo, ou calor, ou a nenhuma causa aparente, podendo manifestar-se ao nascimento ou durante os primeiros anos de vida. Elas podem ser classificadas em Epidermólise Bolhosa simples (EBS), Juncional (EBJ) e distrófica (EBD). Em relação aos tratamentos disponíveis atualmente para as EBs, em geral são apenas paliativos pois não há drogas nem terapias que curam ou mesmo controlam a formação de bolhas de forma definitiva. Em relação à limpeza, existe atualmente no mercado, terapias tópicas eficazes que auxiliam a manutenção das condições ideais de higiene para os portadores de EB.

Objetivos

Este trabalho visa estabelecer um protocolo eficaz na limpeza e cuidados da pele do portador de EB.

Metodologia

Foi aplicado um protocolo de limpeza específico para cada histórico e anamnese dos portadores. Todos os produtos utilizados foram à base de Polihexanida (PHMB a 0,2%), em formas farmacêuticas distintas e diferenciadas, com foco no banho, higienização, remoção de crostas, hidratação, prevenção e tratamento de dermatites, higiene bucal, rompimento de bolhas.

Desenvolvimento / Resultados

Os procedimentos do protocolo acima detalhado, foram efetuados em diversos portadores de Epidermólise Bolhosa, os quais contribuíram para: a otimização do processo de limpeza, melhora geral das condições das lesões, redução do trauma provocado pelas trocas de coberturas, proporcionando um maior conforto ao portador. Registos fotográficos, foram feitos a fim de avaliar a eficácia deste protocolo. Os responsáveis pelos portadores assinaram o Termo de Consentimento, atendendo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil).

Conclusão

O tratamento da Epidermólise Bolhosa, requer cuidados individualizados de acordo com os diferentes tipos de lesões, baseando-se num processo cotidiano. O protocolo descrito, demonstra que os produtos utilizados com Polihexanida (Walkmed) são seguros e eficazes para o tratamento de EB, em decorrência da rápida assepsização instalada nas áreas lesionadas sem afetar a integridade dos tecidos expostos, com controle de infeção sem causar resistência bacteriana, redução do odor, controle do prurido, melhora da cicatrização com manutenção da hidratação cutânea, redução da formação de crostas, contribuindo para uma melhor qualidade de vida do portador.

Referências Bibliográficas

- International Consensus – Best Practice Guidelines for Skin and Wound Care in Epidermolysis Bullosa. Wounds International 2017.
- Pillay, E. ; Clapham, J. Development of best clinical practice guidelines for epidermolysis bullosa. Wounds International 2018 | Vol 9 Issue 4
- ANDRADE, Ana Paula Eufrázio do Nascimento. Randomized clinical trial of the efficacy of polyhexanide in the treatment of oral mucositis in patients with cancer of the head and neck. 92 p. 2016. Dissertation (master's degree)—State University of Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia, Brasil. 2016.
- Denyer, J.E. Wound Management for Children with Epidermolysis Bullosa. Dermatol Clin 28 (2010) 257–264.

- Eberlein, T., Assadian, O.; Clinical Use of Polihexanide on Acute and Chronic Wounds for Antisepsis and Decontamination. *Skin Pharmacol Physiol* 2010;23(suppl 1):45-51.