

FERIDA EM DOENTE EM PROGRAMA REGULAR DE HEMODIÁLISE: ESTUDO DE CASO EM ANGOLA

Susana Isabel Mendes Pinto^{1,2}; Teresa Patrícia Ferreira Martins¹; Carla Moreno d'Oliveira¹; Marlene Amaral de Oliveira Prata¹; Maria Zélia Solano Kieta¹

¹Enfermeiras no Centro de Hemodiálise Sol, Luanda, Angola

²Doutoranda em Enfermagem, Universidade Católica Portuguesa, Porto

INTRODUÇÃO

O envolvimento cutâneo na doença renal crónica (DRC) é caracterizado por uma diversidade de manifestações, que podem ser relacionadas ao processo que causa a falência renal, ao estado urémico ou às medidas terapêuticas.

Apresentação da situação:

Género masculino, raça negra, 64 anos de idade, autónomo de laboral.

Antecedentes patológicos: HTA (causa de DRC), estenose da uretra e DRC.

Em programa regular de hemodiálise desde 2014.

18 de junho de 2021: ferida de etiologia desconhecida na perna esquerda com comprimento de 30 cm. Pele de coloração escurecida com pontos com flutuação. Pulsos presentes, sem sinais de compromisso vascular.

Controlo analítico: leucocitose de 30.000/μL; proteína C Reativa 206 mg/L; hemoglobina 9,1 g/dL.

Hipocalcémia persistente ao longo do tratamento com correção com cálcio oral.

RESULTADOS

Identificação da ferida: 18.06.21



21.06.2021

23.06.2021

Soluto daikin, desbridamento, dreno
Tratamento diário
Antibioterapia com Meropenem e Metronidazol.

3ª semana



28.06.2021
Prontosan gel



09.07.2021
Alginato de Prata



16.07.2021



18.07.2021

6ª semana



03.08.2021
Penso não aderente com
Iodopovidona



11.08.2021
Iodopovidona pomada



23.08.2021



10.09.2021



28.09.2021



20.10.2021



15.11.2021



30.11.2021



08.12.2021

OBJETIVOS

1. Divulgar o processo de cicatrização de uma ferida de grandes dimensões.
2. Refletir sobre a prática realizada.

METODOLOGIA

Estudo de caso.

CONCLUSÃO

Cicatrização da ferida em 25 semanas embora com etiologia desconhecida. Considera-se que os recursos usados foram adequados de acordo com os produtos disponíveis. Garantiram-se como princípios a gestão do exsudado e da dor e o controlo microbiano.