

## **TÍTULO: JUNTOS A CICATRIZAR FERIDAS**

**Autor:** Sandra Filipa Almeida Pereira / Sandra Maria Marques Ferreira / Mariana Almeida Duarte Paiva / Mónica Andreia Pinheiro Lemos

### **Introdução**

Síndrome de Fournier (SF) é uma infeção polimicrobiana sinérgica, causada por bactérias aeróbias e anaeróbias que determinam uma fascíte necrotizante com comprometimento da região perianal, genital e perineal. O diagnóstico é basicamente clínico. O tratamento consiste na correção imediata dos distúrbios hidroeletrólitos, além de antibioterapia de largo espectro, desbridamento cirúrgico de emergência e cirurgia plástica.

No nosso estudo vamos descrever um caso de SF, numa sra de 79 anos, com antecedentes de choque séptico por abscesso perianal; insuficiência renal aguda; HTA; DM tipo II insulínica; nefropatia e retinopatia diabética; anemia não especificada; hipofosfatémia e hipotireoidismo. Doente previamente autónoma.

Utente deu entrada no dia 08 de Setembro 2017, apresenta gangrena de Fournier na região púbica, inguinal direita e períneo. Neste contexto, foi colostomizada e colocada Sonda Vesical. É acompanhada pela cirurgia plástica no CHUC. Realizado exame bacteriológico do tecido necrosado perineal positivo para E. coli. Feita proposta cirúrgica para encerramento e cobertura com auto-enxerto de pele parcial. Gangrena apresenta áreas cruentas com tecido de granulação, mas com drenagem purulenta.

Para além do ajuste terapêutico que foi realizado, optámos por o Apósito de DACC como penso primário, e espuma Sorbion como penso secundário. Através do apósito DACC a gangrena teve boa evolução cicatricial, não sendo necessário recorrer a cirurgia plástica. Após 18 semanas teve alta para domicílio, com lesão de pequenas dimensões.

### **Objetivos**

Demonstrar a importância do uso do Apósito bacteriostático DACC para a cicatrização do SF

Alcançar o máximo de cicatrização possível no menor espaço de tempo;

Reduzir o Odor;

Controlar o exsudado.

### **Metodologia**

Método descritivo e observacional.

Estudo realizado de 08 Setembro 2017 a 02 de Janeiro 2018.

### **Desenvolvimento / Resultados**

Os objetivos inicialmente definidos foram totalmente atingidos. Verificou se uma redução considerável no odor e exsudado em pouco mais de 4 semanas e o doente relatou uma redução significativa da dor durante o período de tratamento. Para nós, equipa, uma mais-valia a utilização destes produtos, desde o apósito DACC, a Espuma sorbion, ao creme barreira.

### **Conclusão**

O Apósito DACC é um penso inovador na gestão da infeção como fase do processo de tratamento em ambiente húmido da ferida, para a inativação bacteriana e fúngica, minimizando o seu metabolismo e replicação.

### **Referências Bibliográficas**

BSn medical, B.(s.d); Cutimed Sorbact. obtido de <http://www.cutimedsorbact.es/indez.html>.